II. NEUROSTIMULÁCIÓS SZIMPÓZIUM ÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG KÖZÖS KONGRESSZUSA, VALAMINT NEUROMODULÁCIÓS „TRÉNING KURZUS”

Pécs, 2010. szeptember 30 – október 2.

Kongresszusi iroda:

Partners Pécs Kft.

Cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Tel./Fax: 06-72/327-572
E-mail: neuro@pcongress.hu
Weblap: www.pcongress.hu

pcongress.hu

SCIENCE AND EXPERIENCE

Végre! Enyhülés. Nyugalom.

A Lyrica gyors és tartós enyhülést biztosít a perifériás és centrális neuropátiás fájdalomtól szenvedő betegek számára[1]

- Hatása már az első héten kialakul
- Tartósan csillapítja a fájdalmat
- Javítja a krónikus fájdalomhoz társuló alvászavart és szorongást

A szokásos dózis napi 300 mg (150-600 mg)[2]

Végre!
LYRICA®
PREGABALIN
Gyors hatás, tartós enyhülés

Lyrica kapszula 75 mg x 56	*Fogy ár[3]: 12 302 Ft*	*TB támogatás (Eü90;2/b) 11 072 Ft;*	*Térítési díj: 1 230 Ft*
Lyrica kapszula 150 mg x 56	*Fogy ár[3]: 18 169 Ft*	*TB támogatás (Eü90; 2/b) 16 352 Ft;*	*Térítési díj: 1 817 Ft*

Lyrica® rövidített alkalmazási előírás:

LYRICA 75 mg, 150 mg kemény kapszula. **Összetétel:** 75 mg illetve 150 mg pregabalin kemény kapszulánként. A 75 mg-os kapszula 8,25 mg, a 150 mg-os kapszula 16,5 mg laktóz-monohidrátot tartalmaz kemény kapszulánként. **Javallatok:** Perifériás és centrális neuropátiás fájdalom. Epilepszia - szekunder generalizációval, vagy anélkül fellépő parciális rohamok adjuváns kezelése. Generalizált szorongás. **Adagolás:** *Neuropátiás fájdalom* A pregabalin kezdő adagja 150 mg naponta, 2-3 adagra elosztva. Az egyénenként változó hatás és tolerabilitás függvényében a napi adag 3-7 nap múlva 300 mg-ra emelhető, és amennyiben szükség van rá, újabb 7 nap múlva a napi adag maximum 600 mg-ig tovább emelhető. Fokozatosan, legalább egy hét alatt kell elvonni. Vesekárosodásban a dózist módosítani kell. Gyermekek kezelésére nem javallt. Idős betegek esetében szükség lehet a pregabalin adagok csökkentésére, amennyiben a beteg csökkent vesefunkcióval rendelkezik. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Figyelmeztetések:** Diabéteszes betegek esetében akiknél a pregabalin-kezelés során súlygyarapodás jelentkezik, szükség lehet a hypoglykaemiás gyógyszer adagolásának módosítására. A pregabalin-kezelés szédüléssel és aluszékonysággal járhat, amely a véletlen sérülések (elesés) gyakoribb előfordulásához vezethet az idősek körében. A betegeket tájékoztatni kell arról, hogy legyenek óvatosak mindaddig, amíg meg nem ismerik a gyógyszer lehetséges hatásait. Öngyilkossági gondolatokról és magatartásról számoltak be különböző indikációkban antiepileptikus gyógyszerekkel kezelt betegeknél. A betegeknek (és a betegek gondozóinak) tanácsolni kell, hogy forduljanak orvoshoz, ha öngyilkossági gondolatok vagy magatartás jelentkezne. Abúzus eseteit jelentették. Óvatosan kezelendők azok a betegek, akiknek az anamnézisében gyógyszerrel való visszaélés szerepel. Ezeknél a betegeknél ellenőrizni kell a pregabalin-abúzus tüneteit.
Terhesség és szoptatás: A Lyricát a terhesség ideje alatt nem szabad alkalmazni, csak akkor, ha erre egyértelműen szükség van (ha az anyára nézve a várható előny nagyobb, mint a magzatra vonatkozó esetleges kockázat). Fogamzóképes nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk. A szoptatás nem javasolt a pregabalin-kezelés alatt. **Legfontosabb mellékhatások:** szédülés, aluszékonyság, megnövekedett étvágy, eufórikus hangulat, zavartság, ingerlékenység, csökkent libido, dezorientáció, insomnia, ataxia, koordinációs zavar, tremor, dysarthria, memóriakárosodás, figyelemzavar, paraesthesia, szedáció, egyensúlyzavar, letargia, homályos látás, diplopia, vertigo, hányás, szájszárazság, székrekedés, flatulentia, erectilis dysfunctio, járászavar, részegség érzése, fáradtság, perifériás ödéma, ödéma, testtömeg növekedés.

A szöveg utolsó ellenőrzésének dátuma: 2010/06
Kérjük, olvassal el a részletes alkalmazási előírást!

Referenciák:
1. Rosenstock J et al. Pain. 2004;110:628-38
2. Lyrica alkalmazási előírás
3. www.oep.hu

A Lyrica® a Pfizer bejegyzett márkaneve.
Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás út 53. Tel.: 488 3700
Pfizer NEUROSCIENCE
LYR 2010/08/02

A Cymbalta első vonalban[1,2,3] ajánlott a diabéteszes neuropátia fájdalmának csökkentésére[4]

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS - CYMBALTA 30 mg és 60 mg kapszula. Terápiás javallatok: Major depresszív zavar kezelése. Felnőttek diabéteszes perifériás neuropátiás fájdalmának kezelése. Generalizált szorongás kezelése. **Adagolás:** Felnőttek, major depresszió: a kezdő és javasolt fenntartó adag napi 1 x 60 mg. Biztonsági szempontból értékelték a max. napi 120 mg-os adagokat. Nincs klinikai bizonyosság, hogy előnyös a dózis emelése azoknak a betegeknek, akik nem reagálnak a kezdeti javasolt gyógyszer adagra. Az antidepresszív válasz állandósulását követően a relapszus elkerülése céljából javasolt több hónapig folytatni a kezelést. Akik reagálnak a duloxetinre, és akik anamnézisében major depressziós epizódok ismételt előfordulása szerepel, megfontolható a napi 60-120 mg-os adaggal végzett, további hosszútávú kezelésük. Generalizált szorongás: a javasolt kezdő adag napi 1 x 30 mg. Ha nem kielégítő a terápiás válasz, az adagot 60 mg-ra kell emelni, ami legtöbbször a szokásos fenntartó adag. Napi 120 mg-ig terjedő adagok hatékonynak bizonyultak és biztonságossági szempontból értékelték a klinikai vizsgálatok során. Ezért nem kielégítő válasz esetén megfontolható a dózis 90 mg-ra vagy 120 mg-ra történő emelése. A dózis emelését a klinikai válaszra és a tolerálhatóságra kell alapozni. A terápiás válasz állandósulását követően a relapszus elkerülése céljából a kezelést javasolt néhány hónapig folytatni. Egyidejű major depresszív zavar esetén a kezdő és a fenntartó adag napi 1 x 60 mg.
A duloxetin biztonságosságát gyermekeknél és serdülőknél nem vizsgálták, ezért alkalmazása ebben a betegcsoportban nem javasolt. Kerülendő a kezelés hirtelen leállítása. A CYMBALTA-kezelés leállításakor a megvonási tünetek kockázatának csökkentése érdekében a dózist legalább 1-2 hét alatt fokozatosan kell lecsökkenteni. **Ellenjavallatok:** túlérzékenység, májkárosodáshoz vezető májbetegség, súlyos vesekárosodás. Nem jól beállított magas vérnyomás, mely hypertenzív krízis lehetséges kockázatával járhat. Ismert hypertonia / szívbetegség esetén a RR ellenőrzése javasolt, különösen a kezelés első hónapja alatt. Depresszió esetén fokozott az öngyilkossággal kapcsolatos események veszélye. Az antidepresszánsok vizsgálata 25 évesnél fiatalabb betegeknél az öngyilkossági viselkedés fokozott kockázatát mutatta. Duloxetin-terápia során és röviddel a kezelés után szuicid gondolatokkal és viselkedéssel járó eseteket jelentettek. A betegeket szoros felügyelet alatt kell tartani, főként a terápia kezdetén, és figyelmeztetni kell őket, hogy azonnal forduljanak orvoshoz, ha öngyilkossági gondolatok és viselkedés jelenne meg. Ugyanilyen elővigyázatosság szükséges egyéb pszichiátriai zavarban szenvedő betegek kezelésekor is. A CYMBALTA MAOI-kal kombinációban nem adható. Nem alkalmazható együttesen CYP1A2 gátlókkal, mint a fluvoxamin, ciprofloxacin vagy enoxacin, mert a kombináció magasabb duloxetin plazmakoncentrációt eredményez. Óvatosság szükséges egyéb olyan gyógyszer szedése esetén, mely májkárosodást okozhat. Duloxetin és orális véralvadásgátlók ill. thrombocita-aggregáció gátlók kombinációjakor a vérzés kockázata esetlegesen emelkedhet. CYMBALTA terhesség alatt csak akkor alkalmazható, ha az ebből származó előny nagyobb, mint a magzatra gyakorolt esetleges kockázat. Szoptatás: A duloxetin kiválasztódik az anyatejbe. Mivel a duloxetin biztonságossága csecsemőkben nem ismeretes, a CYMBALTA szedése szoptatás alatt nem javasolt. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Nagyon gyakori (≥ 10 %) fejfájás, aluszékonyság, szédülés, hányinger, szájszárazság. Gyakori (≥ 1 % és < 10 %) étvágycsökkenés, insomnia, izgatottság, libidocsökkenés, szorongás, szokásostól eltérő orgazmus, szokatlan álmok, tremor, paraesthesia, homályos látás, tinnitus, palpitatio, kipirulás, ásítozás, székrekedés, hasmenés, hányás, dyspepsia, flatulencia, fokozott verejtékezés, kiütés, mozgásszervi fájdalom, izommerevség, izomgörcs, erektilis diszfunkció, kimerülés, hasi fájdalom, fogyás. Nem gyakori (≥ 0,1 % és < 1 %) laryngitis, hyperglykaemia (különösen diabéteszes betegeknél), alvászavar, fogcsikorgatás, dezorientáció, apátia, myoclonus, idegesség, figyelemzavar, letargia, ízérzészavar, dyskinesia, nyugtalan láb sy., nem pihentető alvás, mydriasis, látászavar, forgó jellegű szédülés, fülfájás, tachycardia, SV arrhythmia / pitvarfibrilláció, vérnyomás emelkedés, hűvös végtagok, orthostaticus hypotonia, ájulás, szorító érzés a torokban, orrvérzés, gastroenteritis, eructatio, gastritis, emelkedett májenzim aktivitás, hepatitis, akut májkárosodás, éjszakai verejtékezés, urticaria, contact dermatitis, hideg verejtékezés, fotoszenzitivitási reakciók, fokozott hajlama a véraláfutásra, izomrángás, vizeletretenció, dysuria, akadozó vizelés, nocturia, polyuria, gyengébb vizelet-sugár, ejakulációs zavar, késleltetett ejakuláció, szexuális zavar, nőgyógyászati vérzés, szokatlan érzés, hidegérzet, szomjúság, hidegrázás, rossz közérzet, melegérzet, járászavar, hízás, CPK emelkedés. Ritka ≥ 0,01% és < 0, 1%: anafilaxiás reakció, túlérzékenység, hypothyreosis, dehidráció, hyponatremia, mánia, hallucinációk, agresszió és düh, görcsrohamok, glaucoma, stomatitis, halitosis, haematochezia, trismus, szokatlan szagú vizelet, menopauza tünetei, galactorrhea, hyperprolactinaemia, koleszterin-szint emelkedése. Gyakorisága nem ismert: SIADH, szuicid gondolat és viselkedés, szerotonin szindróma, extrapiramidális tünetek, akathisia, pszichomotoros nyugtalanság, magas vérnyomás, hypertoniás krízis, gastrointestinalis vérzés, sárgaság, májelégtelenség, angioneurotikus oedema, Stevens-Johnson sy, mellkasi fájdalom. A CYMBALTA szedésének leállítása, különösen hirtelen leállításkor gyakran vezet elvonási tünetekhez, leggyakrabban: szédülés, szenzoros zavarok, alvászavar, kimerültség, nyugtalanság vagy szorongás, hányinger és/vagy hányás, tremor, fejfájás, ingerlékenység, hasmenés, fokozott verejtékezés és forgó jellegű szédülés. Diabéteszes neuropátiás fájdalomban szenvedő betegek vizsgálata során kismértékű éhomi vércukor- és összkoleszterin növekedést észleltek. A forgalomba hozatali engedély első kiadásának/ dátuma: 2004. december 17. Jelen alkalmazási előírás elfogadásának dátuma: 2009.11.20.
További információért kérjük, tanulmányozza a gyógyszer részletes alkalmazási előírását, amelyet kérésére elküldünk Önnek.

Cymbalta 30 mg 28x: fogyasztói ára: 9088 Ft.
Beteg térítési díja 90%-os támogatással: 909 Ft
Cymbalta 60 mg 28x: fogyasztói ára: 9998 Ft.
Beteg térítési díja 90%-os támogatással: 1000 Ft

OEP támogatás: EU90 2/b pontban támogatott indikációban a felnőtt cukorbetegek részére, fájdalmas neuropathiában javasolhat és írhat a diabetológiai szakellátóhelyen, járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg gyógyintézetben dolgozó belgyógyász, endokrinológus és neurológus, valamint megkötés nélkül a háziorvos a fent felsorolt szakorvosok javaslatára – a javaslat keltétől számított- 12 hónapig 90%-os támogatással írhatják.
További információ: Lilly Hungária Kft., 1075 Budapest, Madách u 13-14., Tel: (1) 3285100 Fax: (1) 3285101 www.lilly.hu

Hivatkozások:
1. http://guidance.nice.org.uk/CG96
2. Mayo Clin Proc. April 2006; 81 (4 suppl): S12-S25, www.mayoclinicproceedings.com
3. Jenssen et al.Diabetes Vasc. Dis. Res. 2006;3(2):108-119
4. Cymbalta alkalmazási előírás

HUCYM00006
A dokumentum zárásának dátuma: 2010. szeptember 16.

Lilly
Lilly Hungária Kft.
1075 Budapest, Madách u. 13–14.
Tel: (1) 3285100 Fax: (1) 3285101
www.lilly.hu

Cymbalta®
duloxetine HCl